


## Оксаліплатин / Лейковорин / 5FU (OFF) ХС752 (доба 8, 22) (європейський протокол) Рак підшлункової залози та холангіоцелюлярна карцинома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15, 22	Кальцію фолінат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 години	внутрішньовенно
8, 22	Оксаліплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 години	внутрішньовенно
1, 8, 15, 22	Флюороурацил	2000	0,9% NaCl	1000 мл	24 години	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:



### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
43 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Кількість циклів: протягом перебігу захворювання.

(\*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Pelzer U. et al., Onkologie 32: 99ff, 2009.

