ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Оксаліплатин / Лейковорин / 5FU (OFF) XC752 (доба 8, 22) (європейський протокол) Рак підшлункової залози та холангіоцелюлярна карцинома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15, 22	Кальцію фолінат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 години	внутрішньовенно
8, 22	Оксаліплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 години	внутрішньовенно
1, 8, 15, 22	Флюороурацил	2000	0,9% NaCl	1000 мл	24 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:



Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
43 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:
Кількість циклів: протягом перебігу захворювання.
(*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.
Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).
Остання зміна змісту: січень 2016 р.
Література:
Pelzer U. et al., Onkologie 32: 99ff, 2009.