

Оксаліплатин / Лейковорин / 5FU (OFF) ХС752 (доба 8, 22) (європейський протокол) Рак підшлункової залози та холангіоцелюлярна карцинома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15, 22	Кальцію фолінат	200	0,9% NaCl	250	2 години	внутрішньовенно
8, 22	Оксаліплатин	85	5% Глюкоза	500	2 години	внутрішньовенно
1, 8, 15, 22	Флюороурацил	2000	0,9% NaCl	1000	24 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43									
Кальцію фолінат																																																			
■							■																																												
Оксаліплатин																																																			
							■																																												
Флюороурацил																																																			
■							■																																												

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
43 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Кількість циклів: протягом перебігу захворювання.

(*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

Література:

Pelzer U. et al., Onkologie 32: 99ff, 2009.

