

Гемцитабін / Цисплатин ХС592 (європейський протокол) Рак підшлункової залози та холангіоцелюлярна карцинома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1, 8	Гемцитабін	1000	0,9% NaCl	500	30 хвилин	внутрішньовенно
1, 8	Цисплатин	25	0,9% NaCl	500	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Гемцитабін																												
█							█																					
Цисплатин																												
█							█																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
8

Примітка:

Режим у разі холангіогенного раку.

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥ 60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 250 мл 20% розчину Манніту або 40 мг Фуросеміду внутрішньовенно;

Постмедикація: 1000 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно та електролітний баланс.

Література:

Valle J.W., Br J Cancer 101: 621ff, 2009.

