

## 5FU / Лейковорин ХА149 (європейський протокол) Колоректальний рак

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1, 2, 15, 16	Кальцію фолінат	200	0,9% NaCl	250	2 години	внутрішньовенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	400	-	0	Болус	внутрішньовенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	600	0,9% NaCl	500	22 години	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Кальцію фолінат</b>																												
■	■													■	■													
<b>Флюороурацил</b>																												
■	■													■	■													
<b>Флюороурацил</b>																												
■	■													■	■													

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

(\*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

#### Література:

De Gramont A. et al., J Clin Oncol 15: 808ff, 1997.

