

5FU / Лейковорин ХА149 (європейський протокол) Колоректальний рак

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|--------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1, 2, 15, 16 | Кальцію фолінат | 200 | 0,9% NaCl | 250 мл | 2 години | внутрішньовенно |
| 1, 2, 15, 16 | Флюороурацил | 600 | 0,9% NaCl | 500 мл | 22 години | внутрішньовенно |
| 1, 2, 15, 16 | Флюороурацил | 400 | - | 0 | Болюс | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Кальцію фолінат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| █ | █ | | | | | | | | | | | | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | |
| Флюороурацил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| █ | █ | | | | | | | | | | | | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | |
| Флюороурацил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| █ | █ | | | | | | | | | | | | | | █ | █ | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

(*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

De Gramont A. et al., J Clin Oncol 15: 808ff, 1997.

