

## 5FU / Лейковорин / Іринотекан (FOLFIRI) + Бевацизумаб ХС572 + ХА060 (європейський протокол) Колоректальний рак

| Дні терапії  | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник | Об'єм (мл) | Час введення | Шлях введення   |
|--------------|------------------|------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 1, 15        | Бевацизумаб      | 5 мг/кг                      | 0,9% NaCl | 100        | 90 хвилин    | внутрішньовенно |
| 1, 15        | Іринотекан       | 180                          | 0,9% NaCl | 500        | 90 хвилин    | внутрішньовенно |
| 1, 2, 15, 16 | Кальцію фолінат  | 200                          | 0,9% NaCl | 250        | 2 години     | внутрішньовенно |
| 1, 2, 15, 16 | Флюороурацил     | 400                          | -         | 0          | Болюс        | внутрішньовенно |
| 1, 2, 15, 16 | Флюороурацил     | 600                          | 0,9% NaCl | 500        | 22 години    | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

| 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Бевацизумаб</b>     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| █                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | █  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Іринотекан</b>      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| █                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | █  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Кальцію фолінат</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| █                      | █ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | █  | █  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Флюороурацил</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| █                      | █ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | █  | █  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Флюороурацил</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| █                      | █ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | █  | █  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

#### Примітка:

Зверніть увагу! В цій схемі Флюороурацил призначається двічі різними дозуванням і часом введення:

- Флюороурацил 400 мг/м<sup>2</sup> вводиться внутрішньовенно болюсно;
- Флюороурацил 600 мг/м<sup>2</sup> вводиться внутрішньовенно 22 години.

Через особливості функціоналу нашої онлайн-платформи, сума по Флюороурацилу, який вводиться болюсно, не відображається в таблиці, але враховується у загальній вартості за цикл.

Увага! Іринотекан може викликати небезпечну для життя діарею та холінергічний синдром. Діарея може виникнути або в гострій формі або в деякі дні після введення Іринотекану.

Супутня медикація: Атропін 0,2 мг підшкірно або внутрішньовенно.

У разі діареї: Лоперамід, спочатку 4 мг, потім по 2 мг кожні 2 години. Прийом Лопераміду слід продовжувати ще протягом 12 годин після припинення діареї. Якщо вона триває більш ніж 48 годин або у разі лихоманки, рекомендується призначення Ципрофлоксацину та госпіталізація.

(\*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

(\*) Бевацизумаб: Початкову дозу вводять протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості першої інфузії, другу інфузію вводять протягом 60 хв. У разі гарної переносимості 60-хвилинної інфузії, всі наступні інфузії можна вводити протягом 30 хвилин.

#### Література:

Hurwing H. et al., N Engl J Med 350: 2335ff, 2004.

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

