

## 5FU / Лейковорин / Оксаліплатин (FOLFOX IV) + Бевацизумаб ХС588 + ХА060 (європейський протокол) Колоректальний рак

| Дні терапії  | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник  | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення   |
|--------------|------------------|------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1, 15        | Бевацизумаб      | 5 мг/кг                      | 0,9% NaCl  | 100 мл          | 90 хвилин    | внутрішньовенно |
| 1, 2, 15, 16 | Кальцію фолінат  | 200                          | 0,9% NaCl  | 250 мл          | 2 години     | внутрішньовенно |
| 1, 15        | Оксаліплатин     | 85                           | 5% Глюкоза | 500 мл          | 2 години     | внутрішньовенно |
| 1, 2, 15, 16 | Флюороурацил     | 600                          | 0,9% NaCl  | 500 мл          | 22 години    | внутрішньовенно |
| 1, 2, 15, 16 | Флюороурацил     | 400                          | -          | 0               | Болюс        | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

| 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Бевацизумаб</b>     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| █                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | █  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Кальцію фолінат</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| █                      | █ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | █  | █  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Оксаліплатин</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| █                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | █  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Флюороурацил</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| █                      | █ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | █  | █  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Флюороурацил</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| █                      | █ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | █  | █  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6**

#### Примітка:

(\*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

(\*) Бевацизумаб: Початкову дозу вводять протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості першої інфузії, другу інфузію вводять протягом 60 хв. У разі гарної переносимості 60-хвилинної інфузії, всі наступні інфузії можна вводити протягом 30 хвилин.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Saltz et al., J Clin Oncol 26: 2013ff, 2008.

