

5FU / Лейковорин / Оксаліплатин (FOLFOX IV) + Панітумумаб ХС588 + ХА080 (європейський протокол) Колоректальний рак

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл) | Час введення | Шлях введення |
|--------------|------------------|------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 1, 2, 15, 16 | Кальцію фолінат | 200 | 0,9% NaCl | 250 | 2 години | внутрішньовенно |
| 1, 15 | Оксаліплатин | 85 | 5% Глюкоза | 500 | 2 години | внутрішньовенно |
| 1, 15 | Панітумумаб | 6 мг/кг | 0,9% NaCl | 100 | 1 година | внутрішньовенно |
| 1, 2, 15, 16 | Флюороурацил | 600 | 0,9% NaCl | 500 | 22 години | внутрішньовенно |
| 1, 2, 15, 16 | Флюороурацил | 400 | - | 0 | Болюс | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Кальцію фолінат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Оксаліплатин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Панітумумаб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Флюороурацил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Флюороурацил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:
29 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6**

Примітка:

(*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

5FU можна вводити за допомогою інфузійного насоса амбулаторно.

Панітумумаб >1000 мг розчиняють у 150 мл 0,9% розчину NaCl та вводять протягом 90 хвилин.

У разі гарної переносимості, наступні дози можна вводити протягом 30 хвилин.

Література:

Douillard J.Y. et al., J Clin Oncol 28: 4697ff, 2010.

