

## 5FU / Лейковорин / Оксаліплатин (FOLFOX IV) ХС588 (європейський протокол) Колоректальний рак

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 15	Кальцію фолінат	400	0,9% NaCl	250 мл	2 години	внутрішньовенно
1, 15	Оксаліплатин	100	5% Глюкоза	500 мл	2 години	внутрішньовенно
1, 15	Флюороурацил	400	-	0	Болюс	внутрішньовенно
1, 15	Флюороурацил	2400	0,9% NaCl	500 мл	44 години	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Кальцію фолінат</b>																												
█														█														
<b>Оксаліплатин</b>																												
█														█														
<b>Флюороурацил</b>																												
█														█														
<b>Флюороурацил</b>																												
█														█														

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

(\* ) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

5FU можна вводити за допомогою інфузійного насоса амбулаторно.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Maindrault-Goebel F. et al., Eur J Cancer 35: 1338ff, 1999.

