хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

# Іринотекан (щотижня) XC660 (європейський протокол) Колоректальний рак

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м$^2$ | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 8, 15, 22 | Іринотекан | 125 | 0,9% NaCl | 250 мл | 90 минут | внутрішньовенно |

**Графік введення препаратів:**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Іринотекан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Додаткова інформація**

ПОВТОРНО НА:
**36 (день)**

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
**4**

**Примітка:**
**Увага! Іринотекан може викликати небезпечну для життя діарею та холінергічний синдром. Діарея може виникнути або в гострій формі або в деякі дні після введення Іринотекану.**
**Супутня медикація: Атропін 0,2 мг підшкірно або внутрішньовенно.**
**У разі діареї: Лоперамід, спочатку 4 мг, потім по 2 мг кожні 2 години. Прийом Лопераміду слід продовжувати ще протягом 12 годин після припинення діареї. Якщо вона триває більш ніж 48 годин або у разі лихоманки, рекомендується призначення Ципрофлоксацину та госпіталізація.**
**Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).**
**Остання зміна змісту: січень 2016 р.**
**Література:**
**Saltz L.B. et al., N Engl J Med 343: 905ff, 2000.**