

## HD 5FU (змінюється відповідно до режиму Ardalan) XA149 (європейський протокол) Колоректальний рак

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15, 22, 29, 36	Кальцію фолінат	500	0,9% NaCl	250 мл	2 години	внутрішньовенно
1, 8, 15, 22, 29, 36	Флюороурацил	2600	0,9% NaCl	1000 мл	22 години	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>Кальцію фолінат</b>																															
<b>Флюороурацил</b>																															

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
50 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Кількість циклів: У разі гарної переносимості продовжувати протягом всього перебігу захворювання.

(\* Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Weh H.J. et al., Ann Oncol 5: 233ff, 1994.

