

## Доцетаксел (щотижня) ХС412 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15, 22, 29, 36	Доцетаксел	36	0,9% NaCl	100 мл	1 годину	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Доцетаксел																																

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
50 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
4

#### Примітка:

Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.

Ризик виникнення мукозиту знижують шляхом скорочення циклу (доба 1, 8, 15; повторно - на 29 добу).

Супутня медикація: Дексаметазон 8 мг орально 2х щодоби протягом 3 діб, починаючи за один день до прийому Доцетакселу.

У разі відсутності реакції гіперчутливості, дозу Дексаметазону можна знизити до 2х 4 орально в день прийому Доцетакселу.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Hainsworth J.D. et al., J Clin Oncol 19: 3500ff, 2001.

