хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Доцетаксел (щотижня) XC412 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15, 22, 29, 36	Доцетаксел	36	0,9% NaCl	100 мл	1 годину	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Доцетаксел																															

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
50 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
4

Примітка:
Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.
Ризик виникнення мукозиту знижують шляхом скорочення циклу (доба 1, 8, 15; повторно - на 29 добу).
Супутня медикація: Дексаметазон 8 мг орально 2х щодоби протягом 3 діб, починаючи за один день до прийому Доцетакселу.
У разі відсутності реакції гіперчутливості, дозу Дексаметазону можна знизити до 2х 4 орально в день прийому Доцетакселу.
Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).
Остання зміна змісту: січень 2016 р.
Література:
Hainsworth J.D. et al., J Clin Oncol 19: 3500ff, 2001.