

Капецитабін / Оксаліплатин ХС752 (європейський протокол) Колоректальний рак

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1-14	Капецитабін	2000	-	0	-	перорально
1, 8	Оксаліплатин	70	5% Глюкоза	500	2 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Капецитабін																					
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█								
Оксаліплатин																					
█							█														

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
8

Примітка:

2000 мг/м² Капецитабіну розділяють на 2 рівні дози - ранкову та вечірню, через 30 хвилин після прийому їжі.

В якості ад'ювантної терапії, Оксаліплатин призначають у дозі 130 мг/м² в першу добу (повторно на 22 добу), а доза та схема Капецитабіну зберігатиметься на рівні 2000 мг/м². (Кількість циклів: 8).

Зверніть увагу!

• Капецитабін (Capecitabine). Капсули. Дозування ЦПФ «Хемотека»: 150 мг, 250 мг, 500 мг.

Кількість капсул в упаковці: 60 шт., 120 шт.

Можливе виготовлення індивідуальної кількості капсул в упаковці.

Література:

Porschen R. et al., J Clin Oncol 25: 421ff, 2007;

(Haller D. et al., J Clin Oncol 29: 1465ff, 2011).

