

Капецитабін / Оксаліплатин ХС752 (європейський протокол) Колоректальний рак

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1-14 | Капецитабін | 2000 | - | 0 | - | перорально |
| 1, 8 | Оксаліплатин | 70 | 5% Глюкоза | 500 мл | 2 години | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Капецитабін | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Оксаліплатин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
8

Примітка:

2000 мг/м² Капецитабіну розділяють на 2 рівні дози - ранкову та вечірню, через 30 хвилин після прийому їжі.

В якості ад'ювантної терапії, Оксаліплатин призначають у дозі 130 мг/м² в першу добу (повторно на 22 добу), а доза та схема Капецитабіну зберігатиметься на рівні 2000 мг/м². (Кількість циклів: 8).

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Porschen R. et al., J Clin Oncol 25: 421ff, 2007;
(Haller D. et al., J Clin Oncol 29: 1465ff, 2011).

