

## Мітоміцин / 5FU + RT XA149 (європейський протокол) Рак анального каналу

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник | Об'єм (мл) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 1           | Мітоміцин        | 12                           | -         | 0          | Болюс        | внутрішньовенно |
| 1-5, 24-28  | Флюороурацил     | 750                          | 0,9% NaCl | 1000       | 24 години    | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| <b>Мітоміцин</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| ■                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>Флюороурацил</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| ■                   | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |  |

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
31 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
1

#### Примітка:

**Повторно: не призначається!**

**Безперервна інфузія 5FU протягом першого та останнього тижня радіотерапії.**

#### Література:

**UKCCCR Anal Cancer Trial Working Party, Lancet 348: 1049ff, 1996; Bartelink H. et al., J Clin Oncol 15: 2040ff, 1997.**

