

Мітоміцин / 5FU + RT ХА149 (європейський протокол) Рак анального каналу

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Мітоміцин	12	-	0	Болюс	внутрішньовенно
1-5, 24-28	Флюороурацил	750	0,9% NaCl	1000 мл	24 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Мітоміцин																														
█																														
Флюороурацил																														
█	█	█	█	█																				█	█	█	█			

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
31 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
1

Примітка:

Повторно: не призначається!

Безперервна інфузія 5FU протягом першого та останнього тижня радіотерапії.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

UKCCCR Anal Cancer Trial Working Party, Lancet 348: 1049ff, 1996; Bartelink H. et al., J Clin Oncol 15: 2040ff, 1997.

