

Цисплатин / 5FU + Цетуксимаб ХА284 + ХА070 (доба 1), ХА070 (доба 8, 15) (європейський протокол) Рак голови та шиї

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-4	Флюороурацил	1000	0,9% NaCl	1000 мл	22 години	внутрішньовенно
1, 8, 15	Цетуксимаб	250	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Цисплатин	100	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Флюороурацил																					
■	■	■	■																		
Цетуксимаб																					
■							■							■							
Цисплатин																					
■																					

Додаткова інформація

Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥ 60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO₄ внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

(*) Цетуксимаб: Перше введення протягом 120 хвилин. У разі гарної переносимості наступні дози можна вводити протягом 60 хвилин. Обов'язкова перерва протягом 1 години між Цетуксимабом та іншими хіміотерапевтичними речовинами.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Vermorken J.B. et al., N Engl J Med 359: 1116ff, 2008.

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6**

