

# Доцетаксел ХС416 (європейський протокол) Рак голови та шиї

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Доцетаксел	100	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно

## Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Доцетаксел</b>																					

## Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6**

### Примітка:

Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.

Супутня медикація: Дексаметазон 8 мг орально 2х щодоби протягом 3 діб, починаючи за один день до прийому Доцетакселу.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

### Література:

Catimel G. et al., Ann Oncol 5: 543ff, 1994.

