

## DCF XC412 (європейський протокол) Рак голови та шиї

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Доцетаксел	75	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно
1-5	Флюороурацил	750	0,9% NaCl	1000 мл	24 години	внутрішньовенно
1	Цисплатин	75	0,9% NaCl	1000 мл	2 години	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Доцетаксел</b>																					
<b>Флюороурацил</b>																					
<b>Цисплатин</b>																					

### Додаткова інформація

#### Примітка:

Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.

Супутня медикація: Дексаметазон 8 мг орально 2х щодоби протягом 3 днів, починаючи за один день до прийому Доцетакселу.

Цисплатин (лише якщо ШКФ  $\geq 60$  мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Vermorken J.B. et al., N Engl J Med 357: 1695ff, 2007.

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
3

