

EVAIA XC512 (доба 1-3), XC516 (доба 21-23) (європейський протокол) Саркома Юінга, ПНЕП

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
22-24	Актиноміцин D	0,5**	-	0	Болюс	внутрішньовенно
1, 22	Вінкрисин	1,5(*)	0,9% NaCl	100	10 хвилин	внутрішньовенно
1-3	Доксорубіцин	20	0,9% NaCl	250	4 години	внутрішньовенно
1-3, 22-24	Іфосфамід	2000	0,9% NaCl	1000	1 година	внутрішньовенно
1-4, 22-25	Месна	2000	0,9% NaCl	500	24 години	внутрішньовенно
1-3, 22-24	Етопозид	150	0,9% NaCl	1000	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43											
Актиноміцин D																																																					
Вінкрисин																																																					
Доксорубіцин																																																					
Іфосфамід																																																					
Месна																																																					
Етопозид																																																					

Додаткова інформація**ПОВТОРНО НА:
43 (день)****КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2****Примітка:****Якщо загальна доза становить ≥ 200 мг, Етопозид розчиняють у 1000 мл 0,9% NaCl.****(*) Вінкрисин, макс. кількість доз - 2 мг.****(**) Актиноміцин D, макс. кількість доз - 1 мг.****Увага! Доксорубіцин може бути кардіотоксичним при загальній кількості доз ≥ 500 мг/м².****Месна: 20% дози Іфосфаміду, через 0, 4 - 8 год. після прийому Іфосфаміду.****Зверніть увагу!****Месна (Mesna). Виробляється ЦПФ «Хемотека» тільки в скляних флаконах.****Мінімальне замовлення - від 15 флаконів. Можливе приготування в дозах 300-2000 мг у флаконі.****Література:****Schmoll H.-J. et al., Kompendium Internistische Oncology, Springer, S. 2128, 1999.**