ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

EVAIA XC512 (доба 1-3), XC516 (доба 21-23) (європейський протокол) Саркома Юінга, ПНЕП

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
22-24	Актиноміцин D	0,5**	-	0	Болюс	внутрішньовенно
1, 22	Вінкристин	1,5(*)	0,9% NaCl	100	10 хвилин	внутрішньовенно
1-3	Доксорубіцин	20	0,9% NaCl	250	4 години	внутрішньовенно
1-3, 22-24	Іфосфамід	2000	0,9% NaCl	1000	1 година	внутрішньовенно
1-4, 22-25	Месна	2000	0,9% NaCl	500	24 години	внутрішньовенно
1-3, 22-24	Етопозид	150	0,9% NaCl	1000	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:



Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
43 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2

Примітка:
Якщо загальна доза становить ≥200 мг, Етопозид розчиняють у 1000 мл 0,9% NaCl.
(*) Вінкристин, макс. кількість доз - 2 мг.
(**) Актиноміцин D, макс. кількість доз - 1 мг.
Увага! Доксорубіцин може бути кардіотоксичним при загальній кількості доз ≥500 мг/м^2.
Месна: 20% дози Іфосфаміду, через 0, 4 - 8 год. після прийому Іфосфаміду. Зверніть увагу!
Месна (Mesna). Виробляється ЦПФ «Хемотека» тільки в скляних флаконах. Мінімальне замовлення – від 15 флаконів. Можливе приготування в дозах 300-2000 мг у флаконі.
Література:
Schmoll H.-J. et al., Kompendium Internistische Oncology, Springer, S. 2128, 1999.