

Епірубіцин / Іфосфамід ХС476 (європейський протокол) Саркома м'яких тканин

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-5	Іфосфамід	1800	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно
1, 2	Епірубіцин	60	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Іфосфамід																					
Епірубіцин																					

Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
5**

Примітка:

Увага! Епірубіцин може бути кардіотоксичним при загальній дозі ≥ 1000 мг/м².

Месна: 20% дози Іфосфаміду, через 0, 4, 8 год. після прийому Іфосфаміду (перорально або внутрішньовенно).

Підвищений ризик токсичності для ЦНС, якщо доза альбуміну ≤ 3.5 г/дл.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Frustaci S. et al., J Clin Oncol 19: 1238ff, 2001.

