

## Епірубіцин / Іфосфамід ХС476 (європейський протокол) Саркома м'яких тканин

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1-5	Іфосфамід	1800	0,9% NaCl	500	1 година	внутрішньовенно
1, 2	Епірубіцин	60	0,9% NaCl	500	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Іфосфамід</b>																					
<b>Епірубіцин</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
5

#### Примітка:

**Увага! Епірубіцин може бути кардіотоксичним при загальній дозі  $\geq 1000$  мг/м<sup>2</sup>.**

**Месна: 20% дози Іфосфаміду, через 0, 4, 8 год. після прийому Іфосфаміду (перорально або внутрішньовенно).**

**Підвищений ризик токсичності для ЦНС, якщо доза альбуміну  $\leq 3.5$  г/дл.**

#### Література:

**Frustaci S. et al., J Clin Oncol 19: 1238ff, 2001.**

