

## СУВАДИС (ЕОРТС) ХС376 (європейський протокол) Саркома м'яких тканин

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1, 5	Вінкрестин	1(*)	0,9% NaCl	100	10 хвилин	внутрішньовенно
1-5	Дакарбазин	250	0,9% NaCl	500	1 година	внутрішньовенно
1	Доксорубіцин	50	0,9% NaCl	250	1 година	внутрішньовенно
1	Циклофосфамід	500	0,9% NaCl	250	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Вінкрестин</b>																					
■				■																	
<b>Дакарбазин</b>																					
■	■	■	■	■																	
<b>Доксорубіцин</b>																					
■																					
<b>Циклофосфамід</b>																					
■																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Месна: 20% Циклофосфаміду, доза 0, 4, через 8 год після прийому Циклофосфаміду (перорально або внутрішньовенно).

(\*) Вінкрестин, макс. 2 мг.

Увага! Доксорубіцин може бути кардіотоксичним при загальній кількості доз  $\geq 500$  мг/м<sup>2</sup>.

#### Література:

Gottlieb J.A. et al., Cancer Chemother Res 58: 265ff, 1974.

