

СУВАДИС (ЕОРТС) ХС376 (європейський протокол) Саркома м'яких тканин

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 5	Вінкристин	1(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно
1-5	Дакарбазин	250	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Доксорубіцин	50	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Циклофосфамід	500	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Вінкристин																					
■				■																	
Дакарбазин																					
■	■	■	■	■																	
Доксорубіцин																					
■																					
Циклофосфамід																					
■																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Месна: 20% Циклофосфаміду, доза 0, 4, через 8 год після прийому Циклофосфаміду (перорально або внутрішньовенно).

(*) Вінкристин, макс. 2 мг.

Увага! Доксорубіцин може бути кардіотоксичним при загальній кількості доз ≥ 500 мг/м².

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).
Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Gottlieb J.A. et al., Cancer Chemother Res 58: 265ff, 1974.

