

MAID ХС444 (європейський протокол) Саркома м'яких тканин

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-3	Дакарбазин	300	0,9% NaCl	500 мл	24 години	внутрішньовенно
1-3	Доксорубіцин	20	0,9% NaCl	500 мл	24 години	внутрішньовенно
1-3	Іфосфамід	2500	0,9% NaCl	1000 мл	24 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Дакарбазин																					
Доксорубіцин																					
Іфосфамід																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Месна: 20% дози Іфосфаміду, через 0, 4, 8 год після прийому Іфосфаміду (перорально або внутрішньовенно).

Підвищений ризик токсичності для ЦНС, якщо доза альбуміну ≤ 3.5 г/дл.

Увага! Доксорубіцин може бути кардіотоксичним при загальній кількості доз ≥ 500 мг/м².

Дакарбазин: обов'язкова інфузійна система у світлонепроникних контейнерах.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Elias A. et al., J Clin Oncol 7: 1208ff, 1989.

