

## MAID ХС444 (європейський протокол) Саркома м'яких тканин

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-3	Дакарбазин	300	0,9% NaCl	500 мл	24 години	внутрішньовенно
1-3	Доксорубіцин	20	0,9% NaCl	500 мл	24 години	внутрішньовенно
1-3	Іфосфамід	2500	0,9% NaCl	1000 мл	24 години	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Дакарбазин</b>																					
<b>Доксорубіцин</b>																					
<b>Іфосфамід</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

**Месна:** 20% дози Іфосфаміду, через 0, 4, 8 год після прийому Іфосфаміду (перорально або внутрішньовенно).

Підвищений ризик токсичності для ЦНС, якщо доза альбуміну  $\leq 3.5$  г/дл.

**Увага!** Доксорубіцин може бути кардіотоксичним при загальній кількості доз  $\geq 500$  мг/м<sup>2</sup>.

Дакарбазин: обов'язкова інфузійна система у світлонепроникних контейнерах.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Elias A. et al., J Clin Oncol 7: 1208ff, 1989.

