

## Капецитабін / Доцетаксел ХС416 (європейський протокол) Саркома м'яких тканин

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник | Об'єм (мл) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 1, 8        | Гемцитабін       | 900                          | 0,9% NaCl | 500        | 30 хвилин    | внутрішньовенно |
| 8           | Доцетаксел       | 100                          | 0,9% NaCl | 250        | 1 година     | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

| 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Гемцитабін</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                 |   |   |   |   |   |   | ■ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Доцетаксел</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                   |   |   |   |   |   |   | ■ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
3

#### Примітка:

Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.

Супутня медикація: Дексаметазон 8 мг орально  
2х щодоби протягом 3 діб, починаючи за один  
день до прийому Доцетакселу.

#### Література:

Maki R.G. et al., J Clin Oncol 25: 2755ff, 2007.

