

## Сунітиніб ХА149 (європейський протокол) Пухлини шлунково-кишкового тракту

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-30	Сунітиніб	2 x 12,5	-	60 шт	-	перорально

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Сунітиніб																														
[Графік показує щоденне введення препарату протягом 31 днів]																														

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
31 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
постійний прийом

#### Примітка:

**Увага! Гіпотиреоз.**

Сунітиніб можна також приймати постійно при добовій дозі 37,5 мг (George S. et al., J Clin Oncol 27: 3154ff, 2009).

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Demetri G.D. et al., Lancet 368: 1329ff, 2006.

