

Фотемустин ХС564 (європейський протокол) Меланома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15	Фотемустин	100	5% Глюкоза	500 мл	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Фотемустин																												
■							■							■														

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
3

Увага! Схема Фотемустин ХС564 складається з двох етапів - індукція (етап 1) і консолідація (етап 2). Схема лікування оцінюється тільки при проходженні двох етапів.

Кількість циклів: див. Примітку.

Примітка:

* Після індуктивної фази (доба 1, 8, 15), розпочинається фаза консолідації (початок: доба 29-43); Фотемустин 100 мг/м² призначається лише один раз на три тижні.

Кількість циклів визначається за рівнем відповіді (під час прогресування захворювання) або до настання високої гемотоксичності.

Фотемустин забороняється зберігати довше 4 годин при кімнатній температурі.

(Увага! Необхідно забезпечити повний захист від світла).

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Jacquillat C. et al., Cancer 66: 1837ff, 1990.

