

## Іпилимаб / Ніволумаб ХА074 (європейський протокол) Меланома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Іпілімумаб	3 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 хвилин	внутрішньовенно
1	Ніволумаб	1 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Іпілімумаб</b>																					
<b>Ніволумаб</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
4

#### Примітка:

Ніволумаб розводять до 1,0-10,0 мг/мл.

Іпилимаб розводять до 1,0-4,0 мг/мл.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016.

Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Larkin J. et al., N Engl J Med 373: 23ff, 2015;

Postow M.A. et al., N Engl J Med 372: 2006ff, 2015.

