ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Іпилимаб / Ніволумаб XA074 (європейський протокол) Меланома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Іпілімумаб	3 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 хвилин	внутрішньовенно
1	Ніволумаб	1 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Іпілімумаб																					
Ніволумаб																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
4

Примітка:
Ніволумаб розводять до 1,0-10,0 мг/мл.
Іпилимаб розводять до 1,0-4,0 мг/мл.
Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).
Остання зміна змісту: січень 2016 р.
Література:

Larkin J. et al., N Engl J Med 373: 23ff, 2015;
Postow M.A. et al., N Engl J Med 372: 2006ff, 2015.