

Ленватиніб ХА149 (європейський протокол) Рак щитовидної залози

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 1-30 | Ленватиніб | 24 | - | 0 | - | перорально |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Ленватиніб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
31 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
постійний прийом

Література:

Schlumberger M. et al., N Engl J Med 372: 621ff, 2015.

