

Інтерферон альфа + Бевацизумаб ХА149 + ХА060 (європейський протокол) Рак нирки

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Бевацизумаб	10 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 хвилин	внутрішньовенно
1, 3, 5, 8, 10, 12	Інтерферон альфа	3 ММЕ (const)	-	0	-	підшкірно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бевацизумаб														
Інтерферон альфа														

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
15 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2

Примітка:

Кількість циклів: Інтерферон альфа: макс. 52 тижні або під час всього перебігу захворювання;

Бевацизумаб: під час всього перебігу захворювання.

(*). Бевацизумаб: Початкову дозу вводять протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості першої інфузії, другу інфузію вводять протягом 60 хв. У разі гарної переносимості 60-хвилинної інфузії, всі наступні інфузії можна вводити протягом 30 хвилин.

За результатами ретроспективного аналізу дозу ІФН коригують до 6 ММО (61% пацієнтів) або до 3 ММО (31% пацієнтів) без втрати ефективності.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук). Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Escudier B. et al., Lancet 370: 210ff, 2007; Melichar B. et al., Ann Oncol 19: 1470ff, 2008.

