

IMVP-16 ХС656 (європейський протокол) НХЛ гостра

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-5	Іфосфамід	1000	0,9% NaCl	500 мл	1 годину	внутрішньовенно
3, 10	Метотрексат	30	0,9% NaCl	100 мл	15 хвилин	внутрішньовенно
1-3	Етопозид	100	0,9% NaCl	500 мл	2 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Іфосфамід																					
█	█	█	█	█																	
Метотрексат																					
		█							█												
Етопозид																					
█	█	█																			

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2

Примітка:

Якщо загальна доза становить ≥ 200 мг, Етопозид розчиняють у 1000 мл 0,9% розчину NaCl. Месна: 200 мг/м² у 500 мл 0,9% розчину NaCl протягом 30 хвилин одразу до прийому Іфосфаміду, потім 1000 мг/м² протягом 12 год. (починаючи з прийому Іфосфаміду).

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Cabanillas F. et al., Blood 60: 693ff, 1982.

