

## Гемцитабін / Цисплатин ХС592 (європейський протокол) Рак сечового міхура

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15	Гемцитабін	1000	0,9% NaCl	250	30 хвилин	внутрішньовенно
2	Цисплатин	70	0,9% NaCl	500	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Гемцитабін</b>																												
█							█							█														
<b>Цисплатин</b>																												
	█																											

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ  $\geq 60$  мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Література:

Von der Maase H., J Clin Oncol 18: 3068ff, 2000.

