

Вінфлунін ХС882 (європейський протокол) Рак сечового міхура

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 1 | Вінфлунін | 320 | 0,9% NaCl | 100 | 20 хвилин | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Вінфлунін | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Увага! Необхідно забезпечити повний захист від світла.

Увага! Тромбофлебіт; у разі периферійного доступу після Вінфлуніну вводиться 100 мл 0,9% розчину NaCl.

Література:

Krzakowski M. et al., J Clin Oncol 28: 2167ff, 2010.

