

# Вінфлунін ХС882 (європейський протокол) Рак сечового міхура

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Вінфлунін	320	0,9% NaCl	100 мл	20 хвилин	внутрішньовенно

## Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Вінфлунін</b>																					

## Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

### Примітка:

**Увага! Необхідно забезпечити повний захист від світла.**

**Увага! Тромбофлебіт; у разі периферійного доступу після Вінфлуніну вводиться 100 мл 0,9% розчину NaCl.**

**Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).**

**Остання зміна змісту: січень 2016 р.**

### Література:

**Krzakowski M. et al., J Clin Oncol 28: 2167ff, 2010.**

