

Карбоплатин / Паклітаксел + Бевацизумаб ХС772 + ХА060 Рак яєчника

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1	Бевацизумаб	15 мг/кг	0,9% NaCl	100	90 хвилин	внутрішньовенно
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500	30 хвилин	внутрішньовенно
1	Паклітаксел	175	0,9% NaCl	500	3 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Бевацизумаб																					
Карбоплатин																					
Паклітаксел																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Пацитаксел розводять до 0,3-1,2 мг/мл.

Розрахунок дози Карбоплатину (формула Calvert):

Доза (мг) = цільова AUC x (ШКФ + 25).

(* **Бевацизумаб:** Початкову дозу вводять протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості першої інфузії, другу інфузію вводять протягом 60 хв. У разі гарної переносимості 60-хвилинної інфузії, всі наступні інфузії можна вводити протягом 30 хвилин.

Розведені розчини Паклітакселю вводять через інфузійні системи без ПВХ.

Література:

Burger et al., N Engl J Med 365: 2473ff, 2011.

