

## Карбоплатин / Паклітаксел + Бевацизумаб ХС772 + ХА060 Рак яєчника

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Бевацизумаб	15 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 хвилин	внутрішньовенно
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1	Паклітаксел	175	0,9% NaCl	500 мл	3 години	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Бевацизумаб</b>																					
<b>Карбоплатин</b>																					
<b>Паклітаксел</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Паклітаксел розводять до 0,3-1,2 мг/мл.

**Розрахунок дози Карбоплатину (формула Calvert):**

**Доза (мг) = цільова AUC x (ШКФ + 25).**

(\* ) Бевацизумаб: Початкову дозу вводять протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості першої інфузії, другу інфузію вводять протягом 60 хв. У разі гарної переносимості 60-хвилинної інфузії, всі наступні інфузії можна вводити протягом 30 хвилин.

Розведені розчини Паклітакселю вводять через інфузійні системи без ПВХ.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук). Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Burger et al., N Engl J Med 365: 2473ff, 2011.

