

## Карбоплатин / Доцетаксел ХС184 (європейський протокол) Рак яєчника

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник  | Об'єм (мл) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|------------------|------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 1           | Доцетаксел       | 75                           | 0,9% NaCl  | 500        | 1 година     | внутрішньовенно |
| 1           | Карбоплатин      | AUC 5                        | 5% Глюкоза | 500        | 30 хвилин    | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

| 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Доцетаксел</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Карбоплатин</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.

#### Супутня медикація:

Дексаметазон 8 мг орально 2х щодоби протягом 3 діб, починаючи за один день до прийому Доцетакселу.

Розрахунок дози Карбоплатину (формула Calvert):

Доза (мг) = цільова AUC x (ШКФ + 25).

#### Література:

Vasey P.A. et al., J. Natl Cancer Inst 96: 1682ff, 2004.

