

## Карбоплатин / Циклофосфамід ХС184 (європейський протокол) Рак яєчника

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник  | Об'єм (мл) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|------------------|------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 1           | Карбоплатин      | 300                          | 5% Глюкоза | 500        | 1 година     | внутрішньовенно |
| 1           | Циклофосфамід    | 600                          | 0,9% NaCl  | 500        | 1 година     | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

| 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Карбоплатин</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Циклофосфамід</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Месна: 20% дози Циклофосфаміду (якщо загальна доза 1000 мг) внутрішньовенно або перорально через 0, 4, 8 годин після прийому Циклофосфаміду. Належний діурез.

Розрахунок дози Карбоплатину (формула Calvert):

Доза (мг) = цільова AUC x (ШКФ + 25).

#### Література:

Swenerton K. et al., J Clin Oncol 10: 718ff, 1992.

