

Трабектедин / Пегільований ліпосомальний Доксорубіцин ХС454 (європейський протокол) Рак яєчника

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|---|------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 | Пегільований ліпосомальний доксорубіцин | 30 | 5% Глюкоза | 500 мл | 1 година | внутрішньовенно |
| 1 | Трабектедин | 1,1 | 0,9% NaCl | 1000 мл | 3 години | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Пегільований ліпосомальний доксорубіцин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Трабектедин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Пегільований ліпосомальний доксорубіцин розчиняють у 250 мл 5% розчину глюкози, якщо загальна доза ≤ 90 мг та у 500 мл 5% розчину глюкози, якщо загальна доза перевищує 90 мг. У разі наявності центрального венозного катетера, Трабектедин можна також розчинити у 500 мл 0,9% розчину NaCl.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Kaye S.B. et al., Ann Oncol 22: 49ff, 2011.

