

## Трабектедин / Пегільований ліпосомальний Доксорубіцин ХС454 (європейський протокол) Рак яєчника

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Пегільований ліпосомальний доксорубіцин	30	5% Глюкоза	500 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Трабектедин	1,1	0,9% NaCl	1000 мл	3 години	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Пегільований ліпосомальний доксорубіцин</b>																					
<b>Трабектедин</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Пегільований ліпосомальний доксорубіцин розчиняють у 250 мл 5% розчину глюкози, якщо загальна доза  $\leq 90$  мг та у 500 мл 5% розчину глюкози, якщо загальна доза перевищує 90 мг. У разі наявності центрального венозного катетера, Трабектедин можна також розчинити у 500 мл 0,9% розчину NaCl.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Kaye S.B. et al., Ann Oncol 22: 49ff, 2011.

