

Топотекан / Бевацизумаб ХС836 + ХА060 (європейський протокол) Рак яєчника

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1, 15	Бевацизумаб	10 мг/кг	0,9% NaCl	100	90 хвилин	внутрішньовенно
1, 8, 15	Топотекан	4	0,9% NaCl	50	30 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Бевацизумаб																												
■														■														
Топотекан																												
■							■							■														

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Топотекан розводять до 0,025-0,05 мг/мл.

(*) Бевацизумаб: Початкову дозу вводять протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості першої інфузії, другу інфузію вводять протягом 60 хв. У разі гарної переносимості 60-хвилинної інфузії, всі наступні інфузії можна вводити протягом 30 хвилин.

Література:

Pujade-Lauraine E. et al., J Clin Oncol 32: 1302ff, 2014.

