

## ДНАР ХС408 (європейський протокол) НХЛ гостра

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Дексаметазон	40 (const)	-	0	24 години	перорально
2	Цисплатин	100	0,9% NaCl	1000 мл	3 години Кожні 12 годин	внутрішньовенно
1-4	Цитозин-арабінозид	2 x 2000	0,9% NaCl	2*500	-	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Дексаметазон</b>																					
<b>Цисплатин</b>																					
<b>Цитозин-арабінозид</b>																					

### Додаткова інформація

**Примітка:**

**Цитозин-арабінозид:** Дозування 1000 мг/м<sup>2</sup> у пацієнтів >70 років.

**Дексаметазон:** Прийом перорально або внутрішньовенно у вигляді інфузій протягом 15 хвилин.

**Цисплатин** (лише якщо ШКФ ≥60 мл/хв):

**Супутня медикація:**

**Премедикація:** 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

**Постмедикація:** 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

**Автори:** [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

**Література:**

Velasquez W. et al., Blood 71: 117ff, 1988.

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
2

