

Вінорелбін / Гідрокортизон ХС884 (європейський протокол) Рак простати

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8	Вінорельбін	30	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно
1-21	Гідрокортизон	40 (const)	-	0	-	перорально

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Вінорельбін																					
Гідрокортизон																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Вінорелбін вводиться швидко внутрішньовенно.
Увага! Тромбофлебіт; загроза некрозу після екстравазації, тому бажане застосування катетера "Port-A-Cath". Після чого 250 мл 0,9% розчину NaCl.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Abratt R.P. et al., Ann Oncol 15: 1613ff, 2004.

