

Кабазитаксел / Преднізолон ХС166 (європейський протокол) Рак простати

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Кабазитаксел	25	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно
1-30	Преднізолон	10 мг (const)	-	0	-	перорально

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Кабазитаксел																					
Преднізолон																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Кабазитаксел розводять до 0,1-0,26 мг/мл.

Супутня медикація:

Рекомендовано до прийому Кабазитакселу призначити Дексаметазону 8 мг, Ранітидину 50 мг та Дифенгідраміну 30 мг.

Розведені розчини Кабазитакселу вводять через інфузійні системи без ПВХ.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

De Bono J.S. et al., Lancet 376: 1147ff, 2010.

